

Calendar table showing months from May to September with sub-months (Mid, Late) and crop management tasks like sowing, weeding, and harvest.

病虫害防除 (Disease and Pest Control) section. Includes a table of pesticides for various diseases like rice blast and sheath blight, and instructions for application.

いもち病対策 (Bacterial Leaf Blight Countermeasures) section. Provides detailed steps for seed disinfection, field management, and harvest timing to prevent the disease.

レンゲの播種 (Renge Sowing)

- 時期: 10月下旬~11月中旬 (乾燥すると発芽不良になるので、耕起直後か降雨を利用して行う)
○ 播種量 3kg/10a

レンゲの生育を良くするポイント (Points for Good Renge Growth)

- 1. 酸性土壌に弱いので、pHが5.2以下の場合は石灰等により調整する
2. 耕起は均平に行う
3. 排水不良田は排水溝をつくる。(レンゲは停滞水に弱い)

レンゲのすき込み (Renge Weeding)

- 田植えの直前にはすき込みをしない。遅くとも田植えの1ヶ月前頃にすき込むのが望ましい。
○ 有機物が分解する時に土壌中の微量元素が流失しますので、下表のいずれかの土壌改良材を散布する。

Table of soil improvement materials (土壌改良材) with columns for material name (肥料名) and application rate (施肥量) in kg/10a.

その後の管理 (Management After Sowing)

- レンゲの分解によって、稲の根に障害をもたらすことがあります。以下のことを特に注意してください。
1. 水を常時溜めない。水管理は、間断灌水を徹底する。
2. やむを得ず直前にすき込んだ場合は、除草剤を散布後1週間して、一度落水し、酸素不足を改善する。

育苗 (Seedling Raising)

- 1. 資材の準備
○ 種子: 10a当り3.5kg
○ 培土 1箱当り 床土は2.5kg 覆土は1.0kg
○ 山土を使用する場合は、焼酎がら又は培土を容量の3割混合する。
○ 施肥 育苗肥料4・4・4
山土を使用する場合は、育苗肥料4・4・4(1kg)を50箱分の土に使用する。
2. 種子消毒
○ 水20ℓにテクリードCフロアブル100mlを溶かし24時間浸漬させる。(割合は1:2とする) (例: 種子10kgに対し薬剤20ℓ)
又は、温湯60℃に10分間浸漬後、水で十分に冷却し浸種を行う。

播種前後の管理 (Management Before and After Sowing) section. Includes a detailed diagram of a rice seedling with labels for leaves and roots, and instructions for sowing, seedling care, and transplanting.

水稲の基肥 (Rice Basal Fertilizer)

- レンゲの生育状況による肥料の減肥割合を下表に示しています。(施肥量を基準通りに施用すると倒伏や食味低下の原因になります)
○ レンゲの生育状況と生草重はあくまでも目安で、坪刈りを行い生草重を計って、基肥量を決めて下さい。
<レンゲの収量調査の仕方>
1. 平均的な生育の所を数カ所選び、1㎡(1m四方)を刈り取って、草の重さを計る。
2. その重さの平均がレンゲの地上部重量(トン数)になる。

Table showing the relationship between Renge growth status (生育状況) and basal fertilizer application (基肥) based on above-ground weight (地上部生草重).

レンゲの育成状況による基肥施肥量(基肥+穂肥の場合)(10a当り)

施肥(基準量) (Fertilization (Standard Amount))

Table of fertilizer application rates (kg/10a) for basal fertilizer (基肥) and total fertilizer (基肥+穂肥), including components like N, P, and K.

※いもち病の多発圃場では45kg/10aで使用して下さい。

Table of fertilizer application rates (kg/10a) for total fertilizer (基肥+穂肥), including components like N, P, and K.

Table of herbicide names (薬剤名), usage periods (使用時期), usage amounts (使用量), and application frequency (本剤の使用回数).

除草 農薬使用時は必ず別紙の「水稲農薬一覧」を確認 (Weeding: Confirm 'Rice Pesticide List' when using pesticides)

Table of herbicide names (薬剤名), usage periods (使用時期), usage amounts (使用量), and application frequency (本剤の使用回数).

※田面が露出しないようにして散布し、散布後1週間は落水しない事。

Table of herbicide names (薬剤名), usage periods (使用時期), usage amounts (使用量), and application frequency (本剤の使用回数).

この栽培ごよみはJA米の生産基準を兼ねています。要件を満たさない米穀は区分してJAに出荷しましょう。

●農薬を使用する際は、必ずラベルの確認をしましょう●