

夢つくし栽培ごよみ

生産履歴は必ず記帳しよう！

●農薬（毒物・劇物）の購入には、印鑑が必要です。

良質米の生産は基本技術の励行から！

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

スクラム
(50g/箱)

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネシズムシ・コブノメイガ
・いもち病・紋枯病・ウンカ類

灌水を行う。
やかな吸収を促すため、
面を撒き散らさないよう、
基準使用量を厳守し、
育苗の適切な
箱敷すみな

（「病害虫一覧」を参考に
防除薬剤を選択する）

（補正）
コナジラミ
（穂いもちの常発地は
穂出前の2〜3週間前
に投じ込み。）

いもち病
コナジラミ1kg粒剤
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ
コウケツモンスター粒剤3kg

紋枯病
オリブライト250g
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ
コウケツモンスター粒剤3kg

秋ウンカ・カメムシ
スタークル粒剤3kg

いもち病
ブラシンプロアブル 1000倍
紋枯病
モンセレンフロアブル 1500倍

（病害虫に応じて薬剤を選択する）

ウンカ類・カメムシ類
スタークル液剤 1000倍
エクシードフロアブル 2000倍
コブノメイガ
バダンSG水溶剤 1500倍

病害虫防除

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

スクラム
(50g/箱)

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネシズムシ・コブノメイガ
・いもち病・紋枯病・ウンカ類

灌水を行う。
やかな吸収を促すため、
面を撒き散らさないよう、
基準使用量を厳守し、
育苗の適切な
箱敷すみな

（「病害虫一覧」を参考に
防除薬剤を選択する）

（補正）
コナジラミ
（穂いもちの常発地は
穂出前の2〜3週間前
に投じ込み。）

いもち病
コナジラミ1kg粒剤
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ
コウケツモンスター粒剤3kg

紋枯病
オリブライト250g
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ
コウケツモンスター粒剤3kg

秋ウンカ・カメムシ
スタークル粒剤3kg

いもち病
ブラシンプロアブル 1000倍
紋枯病
モンセレンフロアブル 1500倍

（病害虫に応じて薬剤を選択する）

ウンカ類・カメムシ類
スタークル液剤 1000倍
エクシードフロアブル 2000倍
コブノメイガ
バダンSG水溶剤 1500倍

病害虫防除

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

スクラム
(50g/箱)

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネシズムシ・コブノメイガ
・いもち病・紋枯病・ウンカ類

灌水を行う。
やかな吸収を促すため、
面を撒き散らさないよう、
基準使用量を厳守し、
育苗の適切な
箱敷すみな

（「病害虫一覧」を参考に
防除薬剤を選択する）

（補正）
コナジラミ
（穂いもちの常発地は
穂出前の2〜3週間前
に投じ込み。）

いもち病
コナジラミ1kg粒剤
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ
コウケツモンスター粒剤3kg

紋枯病
オリブライト250g
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ
コウケツモンスター粒剤3kg

秋ウンカ・カメムシ
スタークル粒剤3kg

いもち病
ブラシンプロアブル 1000倍
紋枯病
モンセレンフロアブル 1500倍

（病害虫に応じて薬剤を選択する）

ウンカ類・カメムシ類
スタークル液剤 1000倍
エクシードフロアブル 2000倍
コブノメイガ
バダンSG水溶剤 1500倍

病害虫防除

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

スクラム
(50g/箱)

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネシズムシ・コブノメイガ
・いもち病・紋枯病・ウンカ類

灌水を行う。
やかな吸収を促すため、
面を撒き散らさないよう、
基準使用量を厳守し、
育苗の適切な
箱敷すみな

（「病害虫一覧」を参考に
防除薬剤を選択する）

（補正）
コナジラミ
（穂いもちの常発地は
穂出前の2〜3週間前
に投じ込み。）

いもち病
コナジラミ1kg粒剤
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ
コウケツモンスター粒剤3kg

紋枯病
オリブライト250g
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ
コウケツモンスター粒剤3kg

秋ウンカ・カメムシ
スタークル粒剤3kg

いもち病
ブラシンプロアブル 1000倍
紋枯病
モンセレンフロアブル 1500倍

（病害虫に応じて薬剤を選択する）

ウンカ類・カメムシ類
スタークル液剤 1000倍
エクシードフロアブル 2000倍
コブノメイガ
バダンSG水溶剤 1500倍

病害虫防除

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

スクラム
(50g/箱)

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネシズムシ・コブノメイガ

◎穂肥をしない施肥体系（緩効性肥料）					(kg／10a)	
肥 料 名		施 肥 量	成 分 量			
			N	P	K	
基 肥	リンスター30	30		9		
	夢つくし有機一発	50～55	9	4.5	5	

※いもち病の多発圃場では45kg/10aで使用して下さい。

◎基肥＋穂肥の施肥体系

(kg/10a)

肥 料 名		施 肥 量	成 分 量		
			N	P	K
基 肥	リンスター30	30		9	
	レコアップ055	55	5.5	2.7	2.7
穂 肥	スーパーユーキくん3号	25	2.5	0.7	2.0

※レング後の施肥量については、レングの生育量や鋤き込み時期により基肥を加減する。
なたね粕で穂肥を行う場合は、出穂前27～25日前に45kgを施用する。

○適用害虫と使用方法(ジャンボタニシ)

薬剤名	使用時期	使用量	本剤の使用回数
スクミノン	収穫60日前まで	1～4kg	あわせて 2回以内
ジャンボたにくん	収穫60日前まで	1～2kg	

除 草 農薬使用時は必ず別紙の「水稻農薬一覧」を確認
 ◎本田除草剤

剤	除 草 剤 名	使 用 時 期	使 用 法 (10a 当り)	使 用 上 の 注 意
粒 剤	ウルフェース粒剤	移植直後～ ノビエ2.5葉期迄	3kg 湛水	・各種多年性雑草(セリも含む)やノビエ等が全面的に発生する水田。 ・軟弱苗には使用しないこと。
	エーワン 1キロ粒剤	移植後5日～ ノビエ3.0葉期迄	1kg 湛水	・1年生及び多年草の幅広い雑草に有効 雑草を白化させて枯らす。
	エンペラー 1キロ粒剤	移植時～ ノビエ3.0葉期迄	1kg 田植同時 湛水	・田植時同時散布機で施用できる。 ノビエやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。
バク ク 液 剤	エンペラー ジャンボ	移植後3日～ ノビエ3.0葉期迄	10バック (250g) 湛水	・各種多年性雑草やノビエ等が全面的に発生する水田。 ホタルイやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。 ・10バックを水田に均等に投げ込む。
	エンペラー フロアブル	移植後3日～ ノビエ3.0葉期迄	500ml 湛水	・各種多年性雑草やノビエ等が全面的に発生する水田。 ホタルイやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。

※田面が露出しないようにして散布し、散布後1週間は落水しない事。
◎中後期除草剤

対 象 田	除草剤名	使用時期	使用量 (10a当り)	使 用 上 の 注 意
広 葉 雑 草 コナギ・ウリカワ等	バスグラン 粒 剤	移植後15～55日 収穫60日前まで	3～4kg	・ 10a当り3～4kgを均一に散布する。 ・ 散布1～2日前に落水し、足た水くらいで散布する。 ・ 散布後3日間は水を入れないこと。
ノビエ・広葉雑草 コナギ・ウリカワ等	ワイドパワー 粒 剤	移植後20日～ ノビエ5葉期まで 収穫60日前まで	3kg	・ 液剤は、動力噴射機での散布は葉害が生じやすいので、 肩掛け散布器などでスポット処理をすることが望ましい。 ・ 又高温条件下での散布は葉害が生じることがあるので、 散布後に高温が予想される場合は、夕方に散布する。
	ワイド アタックSC	移植後20日～ ノビエ6葉期まで 収穫30日前まで	100ml	

令和5年1月末現在

この栽培ごよみはJA米の生産基準を兼ねています。要件を満たさない米穀は区分してJAに出荷しましょう。

●農薬を使用する際は、必ずラベルの確認をしましょう●