

令和5年産 水稻農薬一覧

○種子消毒剤

農薬名	使用量	使用方法	適用病害虫名
テクリードCフロアブル	1 0 0ml /水 2 0L	24時間種子浸漬	いもち病

○播種前の消毒剤

農薬名	使用量	使用方法	適用病害虫名
タチガレン液剤	1, 0 0 0倍	1箱当たり1L 土壌灌注	苗立枯病

○育苗箱施薬剤

農薬名	使用量 /1箱当り	使用時期	適用病害虫名
ブーンゼクテラ箱粒剤 (紋枯病なし)	5 0 g	移植3日前～ 移植当日	ウンカ類、いもち病、白葉枯病、 、穂枯れ、もみ枯細菌病、ニカメイチュウ、イネミズゾウムシ、 フタオビコヤガ、イネツトムシ、コブノメイガ、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ
スクラム箱粒剤 (紋枯病あり)	5 0 g	移植3日前～ 移植当日	紋枯病 、ウンカ類、いもち病、コブノメイガ、ツマグロヨコバイ、フタオビコヤガ、イネツトムシ、 イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、ニカメイチュウ、もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病、穂枯れ

○初中期除草剤

農薬名	使用適期	使用量 /10a当り	使用 方法	使用上の注意
ウルフエース 粒剤17	移植直後～ノビエ2. 5葉期まで (ただし、移植後30日まで)	3 k g	湛水	・各種多年生雑草(セリも含む)やノビエ等が発生する水田。 ・軟弱苗には使用しないこと。
エーワン 1キロ粒剤	移植後5日～ノビエ3葉期まで (ただし、移植後30日まで)	1 k g	湛水	・1年生及び多年草の幅広い雑草に有効で、雑草を白化させて枯らす。 (薬剤の影響で稲の葉に白化症状が見られる事がありますが、その後正常な葉が 伸展してくるので、生育への影響は少ない)
エンペラー 1キロ粒剤	移植時～ノビエ3葉期まで (ただし、 収穫60日前まで)	1 k g	田植 同時	・田植同時散布機で施用可能。ノビエやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。 ・ 田植同時で使用される場合は、必ず別紙の「エンペラー1キロ粒剤の田植同時使用 における注意事項について」を参照のこと。
エンペラー ジャンボ	移植後3日 ～ノビエ3葉期まで (ただし、移植後30日まで)	10パック (250g)	湛水	・各種多年生雑草(セリも含む)やノビエ等が全面的に発生する水田。ホタルイや コナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。(10パックを均等に投げ込む。) ・ 管内においては、田植後3日以降からの使用を推奨。
エンペラー フロアブル	移植後3日 ～ノビエ3葉期まで (ただし、移植後30日まで)	500ml	湛水	・各種多年生雑草(セリも含む)やノビエ等が全面的に発生する水田。ホタルイや コナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。 ・ 管内においては、田植後3日以降からの使用を推奨。
エンペラー 豆つぶ250	移植後3日 ～ノビエ3葉期まで (ただし、 収穫60日前まで)	250g	湛水	・各種多年生雑草やノビエ等が全面的に発生する水田。ホタルイや コナギ等の抵抗性雑草が発生する水田 ・ 管内においては、田植後3日以降からの使用を推奨。

※田面が露出しないようにして散布し、散布後1週間は落水しない。

○中後期除草剤

対象雑草	農薬名	使用時期	使用量 /10a当り	使用上の注意
広葉雑草・コナギ・ ウリカワ等	バサグラン粒剤	移植後15日～55日 ただし、収穫60日前まで	3～4 k g	・10a当りの散布量を守り均一に散布する。 ・散布1～2日前に落水し足かた水くらいで散布する。 ・散布後3日間は水を入れないこと。 ・液剤は、動力噴射機での散布は薬害が生じやすいの で、肩掛け散布機スポット処理をすることが望ましい。 又、高温条件での散布は薬害を生じることがあるので、 散布後に高温が予想される場合は、夕方に散布する。
	バサグラン液剤	移植後15日～55日 ただし、収穫50日前まで	500～ 700ml	
ノビエ・広葉雑草・コナギ・ ウリカワ等	ワイドパワー粒剤	移植後20日～ノビエ5葉期まで ただし、収穫60日前まで	3 k g	
	ワイドアタックSC	移植後20日～ノビエ6葉期まで ただし、収穫30日前まで	100ml	

○本田防除剤

農薬名		使用時期 (収穫前日数)	使用量 /10a当り	使用回数	適用病害虫名
粉 剤	ビームアプロードスタークル粉剤5DL	14日前まで	3～4 k g	3回以内	いもち病、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
	スタークル粉剤DL	7日前まで	3 k g	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ、 フタオビコヤガ、ニカメイチュウ
	エクシード粉剤DL	7日前まで	3 k g	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
粒 剤	スクミノン	60日前まで	1～4 k g	2回以内	スクミリンゴガイ (ジャンボタニシ)
	ジャンボたにしくん	60日前まで	1～2 k g	2回以内	スクミリンゴガイ (ジャンボタニシ)
	パダン粒剤4	30日前まで	3～4 k g	6回以内	イネツトムシ、コブノメイガ、フタオビコヤガ、 ニカメイチュウ
	コラトップ1キロ粒剤12	葉：初発10日前～初発時 穂：出穂30日前～5日前まで	1～1.5 k g	2回以内	いもち病
	コラトップジャンボP	葉：初発20日前～初発時 穂：出穂30日前～5日前まで	10～13個 (500～650g)	2回以内	いもち病
	スタークル粒剤	7日前まで	3 k g	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ、 ニカメイチュウ
	スタークル豆つぶ	7日前まで	250～500 g	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
	モンカット粒剤	出穂30～10日前 ただし、収穫14日前まで	3～4 k g	3回以内	紋枯病
	オリブライト250G(豆つぶ)	出穂10日前 ただし、収穫45日前まで	250g	1回以内	紋枯病、穂枯れ(ごま葉枯病)、稲こうじ病
液 剤	ゴウケツモンスター粒剤	出穂5日前 ただし、収穫45日前まで	3 k g	1回以内	いもち病、紋枯病、稲こうじ病、穂枯れ(ごま葉枯れ病)、 もみ枯細菌病、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
	パダンSG水溶剤	21日前まで	1,500倍	6回以内	コブノメイガ、イネツトムシ、ニカメイチュウ
	スタークル液剤10	7日前まで	1,000倍	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
	エクシードフロアブル	7日前まで	2,000倍	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
	アプロード水和剤	7日前まで	1,000～ 2,000倍	4回以内	ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫
	モンセレンフロアブル	21日前まで	1,500倍	4回以内	紋枯病
	ブラシNFLフロアブル	7日前まで	1,000倍	2回以内	いもち病、稲こうじ病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、 ごま葉枯病