

月		11			12			1			2			3			4			5			6			
旬		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中		
生育	11月20日播種			播 種 発 芽				有効分げつ期			無効分げつ期			莖立期		節間伸長			出穂期		登 熟 期					
	主な作業と要点	土壌改良剤散布 排水対策 種子消毒 基肥施肥 播種 除草剤散布 11月20日播種	← 麦ふみ (3~4回) → ← 土入れ (2~3回) → ← 除草剤散布 → 追肥 1追肥 2 赤かび防除1回目赤かび防除2回目 穂揃追肥3 カラスノエンドウ 抜き取り 適期刈取																							

1. 品 種 特 性 表 (播種時期の厳守・早播はしない)

品 種 名	播 種 期	播 種 量 (10a当り)	出 穂 期	成 熟 期	注 意 事 項
イチバンボシ (裸麦)	11月20日	7~8kg	4月3日	5月22日	・ 湿害に弱いので排水不良田では作付しない。 ・ 大豆跡には作付しない。(品質が低下するため)
チクゴイズミ (小麦)	11月20日	6~7kg	4月12日	6月4日	・ 大豆跡では苗立ちが良いので播種量は5kgとし、厚播きしない。

2. 施肥、土づくり (土改材は必ず使用する事) (10a)

品 種	土壌改良材	基 肥	追 肥 1	追 肥 2	穂揃追肥3
イチバンボシ	珪鉄・粒状ミネラル 200kg	くみあい化成 ベスト444 40kg	NK2号 20kg	NK2号 10kg	—
	石灰 100kg		ベスト444 25kg	ベスト444 10kg	
チクゴイズミ	珪鉄・粒状ミネラル 200kg	くみあい化成 ベスト444 40kg	NK2号 30kg ベスト444 35kg	NK2号 15kg ベスト444 20kg	硫安※1 10kg~15kg
	石灰 100kg		グッドIB407 30kg	—	

※前作が大豆、野菜の場合には、施肥量を半分にする。
※稲わらは全量すき込むこと。すき込まない場合は基肥を10kg減らす。
※1 チクゴイズミはタンパク質含有率を上げるため、必ず3回追肥をする。(3回目は硫安)

3. 種子消毒

薬 剤 名	処 理 方 法
ベンレートTコート	種子10kgに対し50gを乾粉衣する。

4. シロトビムシ類と鳥害対策 (種子消毒含む)

薬 剤 名	処 理 方 法
キヒゲンR-2フロアブル	種子10kgに対し200mlを塗沫処理する。
クルーザーFS30	種子10kgに対し60mlを塗沫処理する。(小麦に限る)

6. 除 草 (カラスノエンドウ防除の徹底) (10a)

除草剤名	散布時期	使用量(10a)	水 量	使用上の注意	重点雑草の防除方法
ボクサー	播種直後 (スズメノテッポウ は1葉期まで)	400ml 〜 500ml	70~100ℓ	ハーモニー抵抗性スズメノテッポウに効果が高い。	1. スズメノカタビラやカズノコグサが多い圃場 (初期除草剤＋生育期除草剤) 播種直後にボクサー(乳剤)・クリアターン乳剤・細粒剤Fを散布し、更に1月上・中旬にハーモニー75DF水和剤を散布する。 2. ヤエムグラ、カラスノエンドウ等 広葉雑草が多い圃場 ●カラスノエンドウは、2~3葉期までにハーモニー75DF水和剤を散布する。 ●ヤエムグラは、4節期までにハーモニー75DF水和剤を散布する。 カラスノエンドウの子実が麦に混入すると製品にならないので収穫期まで残った場合は必ず手で抜き取る。
リベレーターフロアブル	播種直後	60ml(裸麦) 60~80ml(小麦)	100ℓ	裸麦は、薬害に注意! ノミノフスマに効果が高い。	
クリアターン乳剤	播種直後	500ml 〜 700ml	70~100ℓ	●雑草出芽前に散布する。 ●播種深度は1cm以上とする。 ●ヤエムグラには効果が劣る。	
クリアターン細粒剤F	播種直後	4~5kg	—		
ハーモニー細粒剤F	播種後〜 麦3葉期	4~5kg	—	●土壌が乾燥している場合やヤエムグラには効果が劣る。	
ハーモニー75DF水和剤 (スズメノテッポウ) (5葉期まで)	1月中旬 〜 2月中旬 (莖立期前まで)	7.5~10g	100ℓ	●使用後、タンク及び散布器具は消石灰を用いて洗浄する。 ●土入れ・麦ふみ直後の散布は避ける。 ●周囲に園芸作物がある場合は、飛散しないよう十分注意する。	

※隣接ほ場で他作物が栽培されている場所での農薬散布の際は、周辺作物へ農薬飛散しないよう注意してください。
☆農薬は、令和4年9月9日現在の登録状況にもとづき記載しております。