

元気つくし・ヒノヒカリ栽培ごよみ

生産履歴は必ず記帳しよう！

●農薬（毒物・劇物）の購入には、印鑑が必要です。

良質米の生産は基本技術の励行から！

土づくり

- ・稲わらは水田に全量還元する。
- ・土壌改良材の施用…毎年10a当りミネラルGが珪鉄を200kg散布もしくは、セルカオイスターミネラル100kgを散布する。
- ・基肥に家畜糞尿の醗酵堆積物を使用する場合は、10a当り牛糞堆肥2トンを春先までに施用する。

また発酵鶏糞を施用する場合は150kgを田植2週間前までに施用、基肥の施用量は基準の1/2程度とする。

薬剤名	使用時期	使用量	本剤の使用回数
スクミノン	収穫60日前まで	1～4kg	あわせて 2回以内
ジャンボたにくん	収穫60日前まで	1～2kg	

除 草 剤 農薬使用時は必ず別紙の「水稻農薬一覧」を確認					
◎本田除草剤					
剤	除草剤名	使用時期	使用法 (10a当り)		使用上の注意
粒 剤	クサトツタ粒剤	移植直後～ ノビエ2.5葉期	3kg	湛水	・軟弱苗には使用しないこと。
	キマリテ 1キロ粒剤	移植後5日～ ノビエ3.0葉期	1kg	湛水	・薬害発生が懸念される為、移植5日以降からの使用を推奨。 ・1年生及び多年草の幅広い雑草に有効。 ・雑草を白化させて枯らす。
	エンペラー 1キロ粒剤	移植時～ ノビエ3.0葉期	1kg	田植同時 湛水	・田植同時散布機で施用できる。 ・ノビエやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。
バック 剤	エンペラー ジャンボ	移植後3日～ ノビエ3.0葉期	10バック (250g)	湛水	・各種多年性雑草やノビエ等が全面的に発生する水田。 ・ホタルイやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。 ・10バックを水田に均等に投げ込む。
液 剤	エンペラー フロアブル	移植後3日～ ノビエ3.0葉期	500ml	湛水	・各種多年性雑草やノビエ等が全面的に発生する水田。 ・ホタルイやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。

◎中後期除草剤				
対 象 田	除草剤名	使用時期	使用量 (10a当り)	使 用 上 の 注 意
広 葉 雑 草 コナギ・ウリカワ等	バサグラン 粒 剤	移植後15日～ 収穫45日前まで	3～4kg	・ 10a当り3～4kgを均一に散布する。 ・ 散布1～2日前に落水し、足た水くらいで散布する。 ・ 散布後3日間は水を入れないこと。
	ワイドパワー 粒 剤	移植後20日～ ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで	3kg	・ 液剤は、動力噴射機での散布は葉害が生じやすいので、 肩掛け散布器などでスポット処理をすることが望ましい。 ・ 又高温条件での散布は葉害が生じることがあるので、 散布後に高温が予想される場合は、夕方に散布する。
ノビエ・広葉雑草 コナギ・ウリカワ等	ワイド アタックSC	移植後20日～ ノビエ6葉期 但し、収穫30日前まで	100ml	

令和7年1月末現在

この栽培ごよみはJA米の生産基準を兼ねています。要件を満たさない米穀は区分してJAに出荷しましょう。

●農薬を使用する際は、必ずラベルの確認をしましょう●