

夢つくし栽培ごよみ

生産履歴は必ず記帳しよう！

●農薬（毒物・劇物）の購入には、印鑑が必要です。

良質米の生産は基本技術の励行から！

粉剤体系

粒剤

液剤

粉剤体系

スクラム（紋枯病あり）

(50g/箱)

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネミスズムシ・コブノメイガ
いもち病・紋枯病・ウンカ類

灌水を行う。
やかな吸収を促すため、
面に撒き散らばらないよう
基準使用量を厳守し、いネ
育うへの適切な
苗箱散すみ
全布散すみ

（「病害虫一覧」を参考に
防除薬剤を選択する）

いもち病 コラトップ1kg粒剤12	紋枯病 オリブライト250g	秋ウンカ・カメムシ スタークル粒剤3kg
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ ゴウケツモンスター粒剤3kg		

（病害虫に応じて薬剤を選択する）

いもち病 ブラシフロアブル 1000倍	紋枯病 モンセレンフロアブル 1500倍 ウンカ類・カメムシ類 スタークル液剤10 1000倍 エクシードフロアブル 2000倍	コブノメイガ バダンSG水溶剤 1500倍 ロムダンゾル 1000倍
------------------------	--	--

液剤体系

スクラム（紋枯病あり）

(50g/箱)

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネミスズムシ・コブノメイガ
いもち病・紋枯病・ウンカ類

灌水を行う。
やかな吸収を促すため、
面に撒き散らばらないよう
基準使用量を厳守し、いネ
育うへの適切な
苗箱散すみ
全布散すみ

（「病害虫一覧」を参考に
防除薬剤を選択する）

いもち病 コラトップ1kg粒剤12	紋枯病 オリブライト250g	秋ウンカ・カメムシ スタークル粒剤3kg
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ ゴウケツモンスター粒剤3kg		

（病害虫に応じて薬剤を選択する）

いもち病 ブラシフロアブル 1000倍	紋枯病 モンセレンフロアブル 1500倍 ウンカ類・カメムシ類 スタークル液剤10 1000倍 エクシードフロアブル 2000倍	コブノメイガ バダンSG水溶剤 1500倍 ロムダンゾル 1000倍
------------------------	--	--

液剤体系

粒剤

液剤

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネミスズムシ・コブノメイガ
いもち病・紋枯病・ウンカ類

灌水を行う。
やかな吸収を促すため、
面に撒き散らばらないよう
基準使用量を厳守し、いネ
育うへの適切な
苗箱散すみ
全布散すみ

（「病害虫一覧」を参考に
防除薬剤を選択する）

いもち病 コラトップ1kg粒剤12	紋枯病 オリブライト250g	秋ウンカ・カメムシ スタークル粒剤3kg
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ ゴウケツモンスター粒剤3kg		

（病害虫に応じて薬剤を選択する）

いもち病 ブラシフロアブル 1000倍	紋枯病 モンセレンフロアブル 1500倍 ウンカ類・カメムシ類 スタークル液剤10 1000倍 エクシードフロアブル 2000倍	コブノメイガ バダンSG水溶剤 1500倍 ロムダンゾル 1000倍
------------------------	--	--

液剤体系

粒剤

液剤

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネミスズムシ・コブノメイガ
いもち病・紋枯病・ウンカ類

灌水を行う。
やかな吸収を促すため、
面に撒き散らばらないよう
基準使用量を厳守し、いネ
育うへの適切な
苗箱散すみ
全布散すみ

（「病害虫一覧」を参考に
防除薬剤を選択する）

いもち病 コラトップ1kg粒剤12	紋枯病 オリブライト250g	秋ウンカ・カメムシ スタークル粒剤3kg
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ ゴウケツモンスター粒剤3kg		

（病害虫に応じて薬剤を選択する）

いもち病 ブラシフロアブル 1000倍	紋枯病 モンセレンフロアブル 1500倍 ウンカ類・カメムシ類 スタークル液剤10 1000倍 エクシードフロアブル 2000倍	コブノメイガ バダンSG水溶剤 1500倍 ロムダンゾル 1000倍
------------------------	--	--

液剤体系

粒剤

液剤

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネミスズムシ・コブノメイガ
いもち病・紋枯病・ウンカ類

灌水を行う。
やかな吸収を促すため、
面に撒き散らばらないよう
基準使用量を厳守し、いネ
育うへの適切な
苗箱散すみ
全布散すみ

（「病害虫一覧」を参考に
防除薬剤を選択する）

いもち病 コラトップ1kg粒剤12	紋枯病 オリブライト250g	秋ウンカ・カメムシ スタークル粒剤3kg
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ ゴウケツモンスター粒剤3kg		

（病害虫に応じて薬剤を選択する）

いもち病 ブラシフロアブル 1000倍	紋枯病 モンセレンフロアブル 1500倍 ウンカ類・カメムシ類 スタークル液剤10 1000倍 エクシードフロアブル 2000倍	コブノメイガ バダンSG水溶剤 1500倍 ロムダンゾル 1000倍
------------------------	--	--

液剤体系

粒剤

液剤

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

※注

田植3日前〜当日に施用
・イネミスズムシ・コブノメイガ
いもち病・紋枯病・ウンカ類

灌水を行う。
やかな吸収を促すため、
面に撒き散らばらないよう
基準使用量を厳守し、いネ
育うへの適切な
苗箱散すみ
全布散すみ

（「病害虫一覧」を参考に
防除薬剤を選択する）

いもち病 コラトップ1kg粒剤12	紋枯病 オリブライト250g	秋ウンカ・カメムシ スタークル粒剤3kg
いもち病・紋枯病・ウンカ・カメムシ ゴウケツモンスター粒剤3kg		

（病害虫に応じて薬剤を選択する）

いもち病 ブラシフロアブル 1000倍	紋枯病 モンセレンフロアブル 1500倍 ウンカ類・カメムシ類 スタークル液剤10 1000倍 エクシードフロアブル 2000倍	コブノメイガ バダンSG水溶剤 1500倍 ロムダンゾル 1000倍
------------------------	--	--

液剤体系

粒剤

液剤

病害虫防除

粉剤体系

粒剤

液剤

- ・稲わらは水田に全量還元する。
- ・土壌改良材の施用…毎年10a当りミネラルGか珪鉄を200kg散布もしくは、セルカオイスターミネラル100kgを散布する。
- ・基肥に家畜糞尿の醗酵堆積物を使用する場合は、10a当り牛糞堆肥2トンを春先までに施用する。また発酵鶏糞を使用する場合は、150kgを田植2週間前までに施用して、基肥の施用量は基準の $\frac{1}{2}$ 程度とする。

対 象 田	除草剤名	使用時期	使用量 (10a当り)	使 用 上 の 注 意
広 葉 雑 草 コナギ・ウリカワ等	バサグラン 粒	移植後15日～ 収穫45日前まで	3～4kg	・ 10a当り 3 ～ 4 kgを均一に散布する。 ・ 散布 1 ～ 2 日前に落水し、足かた水くらいで散布する。 ・ 散布後 3 日間は水を入れないこと。
ノビエ・広葉雑草 コナギ・ウリカワ等	ワイドパワー 粒	移植後20日～ ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで	3kg	・ 液剤は、動力噴射機での散布は葉害が生じやすいので、 肩掛け散布器などでスポット処理をすることが望ましい。 又高温条件下での散布は葉害が生じることがあるので、 散布後に高温が予想される場合は、夕方に散布する。
	ワイド アタックSC	移植後20日～ ノビエ6葉期 但し、収穫30日前まで	100ml	

令和7年1月末現在

この栽培ごよみはJA米の生産基準を兼ねています。要件を満たさない米穀は区分してJAに出荷しましょう。

●農薬を使用する際は、必ずラベルの確認をしましょう●