

令和8年産 水稻農薬一覽

○種子消毒剤

農薬名	使用量	使用方法	適用病害虫名
テクリードCフロアブル	100ml /水20L	24時間種子浸漬	いもち病

○播種前の消毒剤

農薬名	使用量	使用方法	適用病害虫名
タチガレン液剤	1,000倍	1箱当り1L 土壤灌注	苗立枯病

○育苗箱施薬剤

農薬名	使用量 /1箱当り	使用時期	適用病害虫名
スクラム箱粒剤 (紋枯病あり)	50g	移植3日前～ 移植当日	紋枯病、ウンカ類、いもち病、コブノメイガ、ツマグロヨコバイ、フタオビコヤガ、イネツトムシ、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、ニカメイチュウ、もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病、穂枯れ

○初中期除草剤

農薬名	使用適期	使用量 /10a当り	使用方法	使用上の注意
クサトッタ粒剤	移植直後～ノビエ2、5葉期 (ただし、移植後30日まで)	3kg	湛水	・軟弱苗には使用しないこと。
キマリテ 1キロ粒剤	移植後5日～ノビエ3葉期 (ただし、移植後30日まで)	1kg	湛水	・1年生及び多年草の幅広い雑草に有効で、雑草を白化させて枯らす。 (薬剤の影響で稲の葉に白化症状が見られる事がありますが、その後正常な葉が伸展してくるので、生育への影響は少ない) ・管内においては、 田植後5日以降からの使用を推奨。
エンペラー 1キロ粒剤	移植時～ノビエ3葉期 (ただし、収穫60日前まで)	1kg	田植同時 湛水	・田植同時散布機で施用可能。ノビエやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。 ・ 田植同時で使用される場合は、必ず別紙の「エンペラー1キロ粒剤の田植同時使用における注意事項について」を参照のこと。
エンペラー ジャンボ	移植後3日～ノビエ3葉期 (ただし、移植後30日まで)	10パック (250g)	湛水	・各種多年生雑草(セリも含む)やノビエ等が全面的に発生する水田。ホタルイやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。(10パックを均等に投げ込む。) ・管内においては、 田植後3日以降からの使用を推奨。
エンペラー フロアブル	移植後3日～ノビエ3葉期 (ただし、移植後30日まで)	500ml	湛水	・各種多年生雑草(セリも含む)やノビエ等が全面的に発生する水田。ホタルイやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。 ・管内においては、 田植後3日以降からの使用を推奨。
エンペラー 豆つぶ250	移植後3日～ノビエ3葉期 (ただし、収穫60日前まで)	250g	湛水	・各種多年生雑草(セリも含む)やノビエ等が全面的に発生する水田。ホタルイやコナギ等の抵抗性雑草が発生する水田。 ・管内においては、 田植後3日以降からの使用を推奨。

※田面が露出しないようにして散布し、散布後1週間は落水しない。

○中後期除草剤

対象雑草	農薬名	使用時期	使用量 /10a当り	使用上の注意
広葉雑草・コナギ・ ウリカワ等	バサグラン粒剤	移植後15日～収穫45日前まで	3～4kg	・10a当りの散布量を守り均一に散布する。 ・散布1～2日前に落水し足かた水くらいで散布する。 ・散布後3日間は水を入れないこと。 ・液剤は、動力噴射機での散布は薬害が生じやすいので、肩掛け散布機スポット処理をすることが望ましい。 又、高温条件での散布は薬害を生じることがあるので、散布後に高温が予想される場合は、夕方に散布する。
	バサグラン液剤	移植後15日～収穫45日前まで	500～ 700ml	
ノビエ・広葉雑草・コナギ・ ウリカワ等	ワイドパワー粒剤	移植後20日～ノビエ5葉期 ただし、収穫45日前まで	3kg	
	ワイドアタックSC	移植後20日～ノビエ6葉期 ただし、収穫30日前まで	100ml	

○本田防除剤

農薬名	使用時期 (収穫前日数)	使用量 /10a当り	使用回数	適用病害虫名	
粉剤	ビームモンセレンスタークル粉剤5DL	21日前まで	3～4kg	3回以内	いもち病、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ、紋枯病
	ブラシン粉剤DL	7日前まで	3～4kg	2回以内	いもち病、ごま葉枯病、変色米、穂枯れ
	スタークル粉剤DL	7日前まで	3kg	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ
	エクシード粉剤DL	7日前まで	3kg	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
粒剤	スクミノン	60日前まで	1～4kg	2回以内	スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)
	ジャンボたにしくん	60日前まで	1～2kg	2回以内	スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)
	パダン粒剤4	30日前まで	3～4kg	6回以内	コブノメイガ、イネツトムシ、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ
	スタークル粒剤	7日前まで	3kg	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ
	スタークル豆つぶ	7日前まで	250～500g	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
	コラトップ1キロ粒剤12	葉：初発10日前～初発時 穂：出穂30日前～5日前まで	1～1.5kg	2回以内	いもち病
	コラトップジャンボP	葉：初発20日前～初発時 穂：出穂30日前～5日前まで	10～13個 (500～650g)	2回以内	いもち病
	モンカット粒剤	出穂30～10日前 ただし、収穫14日前まで	3～4kg	4回以内	紋枯病
	オリブライト250G(豆つぶ)	出穂10日前まで ただし、収穫45日前まで	250g	1回	紋枯病、穂枯れ(ごま葉枯病)、稲こうじ病
	ゴウケツモンスター粒剤	出穂5日前まで ただし、収穫45日前まで	3kg	1回	いもち病、紋枯病、稲こうじ病、穂枯れ(ごま葉枯れ病)、もみ枯細菌病、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
液剤	パダンSG水溶剤	21日前まで	1,500倍	6回以内	コブノメイガ、イネツトムシ、ニカメイチュウ
	スタークル液剤10	7日前まで	1,000倍	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
	エクシードフロアブル	7日前まで	2,000倍	3回以内	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ
	オーケストラフロアブル	7日前まで	1,000倍	3回以内	ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫
	モンセレンフロアブル	21日前まで	1,500倍	4回以内	紋枯病
	ロムダンズル	21日前まで	1,000倍	2回以内	コブノメイガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ
	ブラシンフロアブル	7日前まで	1,000倍	2回以内	いもち病、稲こうじ病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、ごま葉枯病、変色米、穂枯れ